

1. En algunas personas que se encuentran abstinentes del consumo de tabaco se produce/producen: **A)** una reducción del apetito; **B)** disminuciones motoras; **C)** un deseo de mayor interacción con los demás; **D)** alucinaciones durante la noche.
2. Los efectos de la nicotina cuando se consume en un estado de ansiedad o estrés: **A)** se potencian; **B)** disminuyen; **C)** se traducen en una mayor liberación de dopamina; **D)** generan más irritabilidad.
3. Los estudios que se han hecho para evaluar el tipo de consumidores que podrían beneficiarse de los programas de consumo controlado indican que: **A)** no se puede concluir nada con claridad; **B)** serían, sobre todo, de utilidad para los de un consumo muy arraigado; **C)** serían de mayor utilidad para los usuarios de drogas ilegales que para los de drogas legales; **D)** mejorarían especialmente los consumidores dependientes de alcohol.
4. Lamentablemente, muchos jóvenes españoles consumen grandes cantidades de alcohol los fines de semana llegando, incluso, a cuadros de intoxicación que requieren ingreso hospitalario. En estos casos de intoxicación, uno de los aspectos esenciales en los que debe centrarse el tratamiento a aplicar es en: **A)** la dependencia; **B)** los síntomas; **C)** la compulsión al consumo; **D)** la incapacidad de parar una vez iniciado el consumo.
5. En el tratamiento de la compulsión al consumo, los fármacos con actividad serotoninérgica: **A)** han demostrado ser eficaces; **B)** no parecen ser eficaces, excepto cuando hay asociados aspectos afectivos a esa conducta; **C)** no suelen utilizarse; **D)** han dado lugar a resultados contradictorios.
6. El efecto terapéutico de la cianamida cálcica se basa, en última instancia, en su actividad sobre: **A)** la aldehído deshidrogenasa; **B)** el acetaldehído; **C)** el metabolismo del disulfiram; **D)** la ecgonina.
7. Hay estudios que han comparado la eficacia de un tratamiento en función del medio asistencial en el que se lleve a cabo, resultando que: **A)** no puede concluirse nada con seguridad; **B)** el medio hospitalario es mejor que el ambulatorio después de un año de seguimiento; **C)** el medio hospitalario es peor que el ambulatorio después de un año de seguimiento; **D)** no hay diferencia entre un medio asistencial hospitalario y otro ambulatorio después de seguimientos inferiores a seis meses.
8. Los estudios realizados hasta la fecha para evaluar la eficacia de las terapias psicodinámicas aplicadas a pacientes adictos con un elevado grado de sociopatía han comprobado que esos tratamientos: **A)** no son eficaces; **B)** son eficaces; **C)** son más eficaces si se llevan a cabo en un formato grupal; **D)** alcanzan un nivel de eficacia comparable al de otras terapias capaces de establecer conductas sociales compatibles con el mantenimiento de la abstinencia de la droga.
9. Entre otros casos posibles, cuando el paciente tiene un mal control de impulsos y poca capacidad de juicio, el medio asistencial de tratamiento más adecuado es: **A)** el ambulatorio; **B)** una comunidad terapéutica; **C)** el hospitalario; **D)** un hospital de día.
10. Uno de los efectos del consumo de anabolizantes esteroideos es el de: **A)** ataques sexuales; **B)** amnesia; **C)** celos paranoides; **D)** pérdida de la audición.

11. Una sustancia que se ha asociado a ataques sexuales que han sufrido las personas que las han consumido es: **A)** flunitracepam; **B)** nitrito de isobutilo; **C)** MBDB; **D)** tolueno.
12. En caso de intoxicación por consumo de plantas alucinógenas de la familia de las Solanáceas, en el tratamiento pertinente puede incluirse la administración de: **A)** escopolamina; **B)** atropina; **C)** fisostigmina; **D)** hiosciamina.
13. Tras el consumo de distintos tipos de drogas, incluido el alcohol, es frecuente la aparición de temblores que se cree son debidos a un aumento de: **A)** los canales de calcio dependientes de voltaje; **B)** la transmisión noradrenérgica; **C)** la transmisión gabaérgica; **D)** la transmisión dopaminérgica.
14. Basándonos en los resultados de estudios de discriminación de nicotina y cocaína hechos hasta la fecha con animales, podría pensarse que el consumo previo de nicotina: **A)** no afectaría a un posible consumo posterior de cocaína; **B)** no sensibilizaría a las personas para un consumo posterior de cocaína; **C)** reduciría las sensaciones aversivas inducidas por la retirada de cocaína; **D)** facilitaría un posible consumo posterior de cocaína.
15. La(s) teoría(s) sociológica(s) de la drogadicción que mantienen que el individuo está forzado por factores extraños a él es (son) la (s) de: **A)** la desorganización social; **B)** la tensión social; **C)** la subcultura; **D)** los procesos sociales.
16. Diversos estudios realizados sobre la utilidad de fármacos con actividad dopaminérgica en el tratamiento de la compulsión al consumo han demostrado que esos compuestos: **A)** son eficaces; **B)** no son eficaces; **C)** son efectivos en el caso del alcoholismo, cuando se da condicionamiento de estímulos asociados al consumo; **D)** han dado lugar a efectos contradictorios.
17. Entre otros mecanismos de acción, los cannabinoides actúan para producir sus efectos directamente sobre canales de: **A)** cloro; **B)** potasio; **C)** sodio; **D)** calcio.
18. El consumo de fenciclidina puede dejar secuelas a largo plazo que se manifiestan incluso después de un año de haber dejado de consumir. Entre otros síntomas que pueden aparecer están: **A)** aumento del peso corporal; **B)** hiperexcitación; **C)** inapetencia; **D)** dificultades para hablar y pensar.
19. De entre los consumidores de inhalantes, los que pueden tener un mayor riesgo de desarrollar un sarcoma de Kaposi son los que tomen con mayor frecuencia: **A)** disolventes; **B)** gases; **C)** aerosoles; **D)** nitritos.
20. El síndrome de Wernike-Korsakoff es típico de pacientes con alcoholismo crónico, pero puede darse también en personas que tengan: **A)** degeneración retiniana; **B)** demencia; **C)** anorexia; **D)** alcoholismo fetal.